



Coliques chez le cheval

Guide

Types - Symptômes - Prévention



Equine 74 E-Book

DANS CET E-BOOK, VOUS APPRENDREZ...

- ✓ ce qu'est une colique
- ✓ les différents types de coliques
- ✓ les causes possibles des coliques
- ✓ comment reconnaître les symptômes de colique
- ✓ comment agir correctement en cas d'urgence
- ✓ comment prévenir les coliques



TABLE DES MATIÈRES

1. Que sont les coliques ?	1
2. Types de coliques	2
2.1. Coliques spasmodiques	2
2.2. Coliques de sable	3
2.3. Coliques gazeuses	3
2.4. Surcharge d'estomac	3
2.5. Obstruction intestinale	3
2.6. Déplacement intestinal	3
2.7. Impaction intestinale	4
2.8. Constipation du gros intestin	4
2.9. Obstruction de l'intestin grêle	4
3. Symptômes	5
4. Les coliques : Cause ou symptôme ?	6
5. Conseils en cas d'urgence	7
6. Gestion des coliques	9
6.1. Prévention	9
6.2. Garde en boxes	10
7. Check-list prévention	11

Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés dans l'ensemble du livre électronique sont neutres du point de vue du genre. Toutes les désignations de personnes s'appliquent à tous les sexes.

1. QUE SONT LES COLIQUES ?

Les coliques sont très connues des professionnels du cheval. Presque tout le monde a déjà fait l'expérience d'une colique ou a été témoin de l'apparition de symptômes de colique chez un cheval dans une écurie.

Les coliques sont un terme générique désignant tous les troubles digestifs et tableaux cliniques liés au tube digestif du cheval. Ils sont toujours douloureux pour les chevaux et, dans le pire des cas, mettent même leur vie en danger - et malheureusement souvent complexes dans leur apparition.

De par leur anatomie, les chevaux sont toujours sujets aux coliques. Ainsi, si votre cheval souffre de coliques, cela ne fait pas de vous un mauvais propriétaire. Il est important de reconnaître les symptômes des coliques chez un cheval afin de pouvoir consulter rapidement votre vétérinaire de confiance en cas de suspicion.

Une colique n'est donc pas une maladie spécifique, mais un ensemble de symptômes qui se manifestent par des douleurs abdominales. Les coliques peuvent avoir les causes les plus diverses, par exemple une constipation, un déplacement ou une torsion de l'intestin.

La variante la plus répandue des coliques est constituée de contractions spasmodiques de l'intestin. Dans un tel cas, un traitement avec des antispasmodiques est généralement suffisant.

Malheureusement, il n'est pas rare qu'aucune raison ne puisse être identifiée pour l'apparition d'une colique - on parle alors de coliques idiopathiques, définies comme celles sans cause connue.

Les coliques comme symptôme

Mais les coliques peuvent également être elles-mêmes un symptôme, c'est-à-dire qu'elles peuvent indiquer des problèmes de santé chez le cheval. Par exemple, les constipations peuvent être le signe d'une mauvaise santé dentaire, lorsque le cheval ne mastique pas correctement sa nourriture et que les boulettes de nourriture restent « coincées » dans l'intestin.

Les autres problèmes de santé généralement cités comme symptômes des coliques sont les problèmes cardiaques, les lésions hépatiques telles que l'hépatite, la pleurésie et les calculs rénaux et vésicaux.

Les coliques peuvent également survenir dans le cadre d'une mise-bas.

2. TYPES DE COLIQUES

Les coliques sont fréquentes chez les chevaux parce que l'intérieur du cheval n'est tout simplement pas aussi solidement attaché qu'il devrait l'être. A partir de ce problème, une grande variété de troubles digestifs surviennent chez les chevaux.

En outre, une colique chez le cheval peut également être favorisée, voire provoquée, par une mauvaise alimentation. Les chevaux sont des animaux des steppes, leur organisme tout entier est conçu pour se nourrir et se déplacer en permanence. L'anatomie du cheval n'est pas adaptée à la vie en milieu humain et aux modifications de l'alimentation et de l'élevage qui en découlent.



On distingue neuf types de coliques, qui ont toutes des causes et des symptômes différents :

2.1. Coliques spasmodiques

Les chevaux atteints de crampes coliques souffrent de spasmes intestinaux douloureux et sévères. Les coliques crampes sont causées par une mauvaise alimentation, le stress ou une infestation de vers.

2.2. Coliques de sable

Les chevaux qui sont élevés dans des zones sablonneuses et qui doivent se nourrir au sol courent le risque de contracter des coliques de sable. L'ingestion de sable irrite la muqueuse de l'intestin et, en cas de grande quantité de sable, il existe un risque de torsion du gros intestin. Les chevaux dans les zones sablonneuses ne devraient donc pas avoir à se nourrir au sol et devraient toujours avoir de l'eau fraîche à disposition.

2.3. Coliques gazeuses

Les coliques gazeuses sont causées chez les chevaux par l'ingestion d'aliments qui produisent des gaz dans l'estomac du cheval. Ces aliments comprennent, par exemple, du pain, du trèfle et de l'herbe fermentée. Ce gaz s'accumule dans l'intestin et provoque des dilatations douloureuses. De plus, l'accumulation de gaz peut provoquer un déplacement et un piégeage des intestins, ce qui est également très douloureux pour les chevaux atteints.

2.4. Surcharge d'estomac

Les surcharges gastriques sont divisées en surcharges primaires et secondaires. Une surcharge primaire de l'estomac du cheval est causée par un gonflement de la nourriture. En revanche, une surcharge gastrique secondaire est le résultat d'un blocage ou d'une torsion intestinale. En cas de surcharge gastrique primaire et secondaire, l'estomac du cheval se dilate de manière anormale, ce qui est très douloureux.

2.5. Obstruction intestinale

L'obstruction intestinale chez le cheval se produit lorsque les muscles de l'intestin cessent de fonctionner parce qu'ils sont à l'étroit ou paralysés. Les tumeurs se développant sur la paroi intestinale peuvent également provoquer une occlusion intestinale.

2.6. Déplacement intestinal

Il existe deux types de déplacement intestinal chez le cheval : vers la gauche et vers la droite. Lors d'un déplacement vers la gauche, une partie du gros intestin est déplacée dans un espace situé entre le rein gauche et la rate. Dans la deuxième variante, l'appendice est touché. Un déplacement du gros intestin est généralement provoqué par des gaz présents dans l'intestin du cheval qui tentent de s'échapper, poussant l'intestin sous une forte pression dans tous les coins possibles de l'abdomen.

2.7. Impaction intestinale

L'impaction intestinale chez le cheval n'est possible que si il existe des lacunes dans les muscles du cheval. L'intestin se glisse alors dans ces interstices et y reste piégé.

2.8. Constipation du gros intestin

La principale raison des coliques de constipation chez les chevaux est une consommation d'eau insuffisante. En raison du manque de liquide, la bouillie alimentaire dans l'intestin devient trop solide et obstrue ainsi le système digestif du cheval. Mais trop peu d'exercice, une mauvaise alimentation ou de mauvaises dents peuvent également favoriser la constipation. Si le cheval n'est pas capable de mastiquer correctement sa nourriture, cela favorisera la constipation.

2.9. Obstruction de l'intestin grêle

L'obstruction de l'intestin grêle chez les chevaux est généralement causée par une alimentation incorrecte. Par exemple, nourrir avec de l'herbe coupée peut être le déclencheur d'une obstruction de l'intestin grêle.




3. Symptômes

Les symptômes des coliques peuvent être très variés. Rien qu'en raison des différentes causes, d'innombrables symptômes apparaissent. De plus, chaque cheval réagit différemment à la douleur.

Comportement du cheval indiquant des coliques

Les symptômes habituels sont le piétinement, le fait de regarder son propre côté, le fait de se coucher fréquemment, une lèvre supérieure plissée, le fait de se rouler, la transpiration et le manque d'appétit. En outre, il peut arriver que le cheval s'assoie dans une position similaire à celle d'un chien ou qu'il étende son propre corps comme s'il voulait uriner, ce qui ne se produit pas. Chez certains chevaux, on peut également observer une position de la tête par ailleurs inhabituelle.



Une bonne observation de l'animal est donc un aspect décisif pour savoir si un cheval a des problèmes de santé. Pour cela, il est important de savoir comment le cheval se comporte lorsqu'il est en bonne santé. Il se peut qu'il aime se rouler dans le pré. Mais si ce n'est pas le cas et que d'autres symptômes sont observés, il faut absolument agir.

4. Les coliques chez le cheval sont-elles une cause ou un symptôme ?

Comme nous l'avons déjà mentionné, les coliques ne sont pas une maladie spécifique, mais un ensemble de symptômes qui se manifestent par des douleurs abdominales ; de même, elles peuvent être le signe d'autres problèmes.

De plus, les coliques ne sont pas seulement le signe de problèmes digestifs. Les problèmes de foie et de reins ne sont que deux exemples d'une longue liste de maladies et d'événements qui peuvent s'exprimer par des coliques ou les provoquer.

Parmi les autres facteurs, on peut citer les poulinages (qu'ils soient sans ou avec complications), les calculs rénaux et vésicaux, les maladies du foie, les problèmes cardiaques, une forte infestation de vers ou encore les intoxications.



S'il est vrai que certaines coliques surviennent sans raison apparente, les autres variantes ont bel et bien une origine. C'est pourquoi les coliques sont elles-mêmes considérées comme un symptôme révélateur de véritables problèmes. Il est bien sûr important de reconnaître et de traiter les coliques, mais il convient de trouver l'origine de la maladie.

Les problèmes digestifs tels que la constipation due à l'ingestion de trop grandes quantités de nourriture en peu de temps sont un bon exemple de ce qu'il faut faire après le traitement des coliques. Si l'on parvient à éliminer la constipation par l'hydratation ou, dans le pire des cas, par une opération, les coliques n'auront plus lieu d'être.

Outre une mauvaise qualité de l'alimentation, les engorgements ne sont pas uniquement dus à une trop grande quantité de nourriture, la qualité de l'eau joue également un rôle. Bien sûr, l'eau doit être disponible en permanence. Mais si elle est vieille, périmée et non potable pour les chevaux, ils se déshydratent et une colique peut s'ensuivre.

5. CONSEILS EN CAS D'URGENCE

Si tu as remarqué que ton cheval souffre de coliques, la première chose à faire est de rester calme. Contacte immédiatement ton vétérinaire. Cela vaut bien sûr aussi si tu as « seulement » un soupçon. Mieux vaut appeler le vétérinaire une fois de trop qu'une fois de moins.

Que puis-je faire en attendant l'arrivée du vétérinaire ?

Il existe plusieurs possibilités de faire ce que vous pouvez avec votre cheval en attendant l'arrivée du vétérinaire. Il peut par exemple être utile de vous promener lentement avec votre cheval. Dans le meilleur des cas, cela distrait un peu votre cheval et le détend, et le mouvement peut en outre augmenter l'activité intestinale.

S'il ne vous est pas possible de faire sortir votre cheval du box sans danger, il vaut mieux ne pas le faire. Dans ce cas, vous devez toutefois veiller à ce que votre cheval n'ait pas de nourriture à sa disposition.

Autrefois, il était absolument interdit de laisser le cheval se rouler. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans certains cas, le fait de se rouler peut même permettre au cheval de se reposer. Il faut toutefois éviter de laisser le cheval couché sur le côté pendant une longue période, car la circulation du cheval peut en souffrir. Si votre cheval a tendance à se lever difficilement ou à s'immobiliser fréquemment, vous devriez l'empêcher de se rouler.



Vous devez emmener votre cheval dans un endroit où un examen est possible sans aucun problème, cela peut bien sûr aussi être le box à chevaux.

Si vous travaillez depuis longtemps avec votre vétérinaire, il devrait déjà connaître votre cheval ou être en mesure de se faire rapidement une idée de l'historique médical. Si cela n'est pas possible ou si un autre vétérinaire vient à la rescousse, il serait utile de disposer d'un classeur contenant toutes les informations sur les maladies antérieures, les vaccins, les vermifuges, etc.



Parfois, un changement d'aliment ou une ration non optimale peut également entraîner des problèmes digestifs. Les bactéries intestinales s'adaptent à la nourriture dans leur diversité. Un changement de « recette » perturbe ce système. Par conséquent, si un changement de nourriture a eu lieu récemment, vous devez absolument le signaler.

Lorsque le vétérinaire arrive, il commence par examiner le rythme cardiaque et respiratoire de votre cheval et par prendre sa température corporelle. Une température élevée est un indicateur fiable de douleur. La couleur et l'irrigation des muqueuses seront également contrôlées.

6. GESTION ET PRÉVENTION DES COLIQUES

Comme nous l'avons mentionné au début, les coliques ne peuvent guère être vraiment évitées en raison de l'anatomie du cheval. De plus, elles sont difficiles à localiser. Même les spécialistes peuvent, dans certaines situations, reconnaître et traiter une colique, mais ne peuvent pas nommer un facteur déclenchant.

Cela rend toute gestion de la prévention difficile, mais cela signifie aussi qu'en tant que propriétaire, vous n'avez pas à vous reprocher si votre cheval souffre de coliques. Vous pouvez néanmoins exercer une influence et prendre des mesures préventives.

Outre une bonne qualité constante de l'alimentation, cela implique bien entendu une quantité suffisante d'eau de bonne qualité ainsi qu'un maximum d'incitation à l'exercice. Sur un sol sablonneux (p.ex. un paddock), la consommation de nourriture ne devrait pas se faire à partir du sol.

6.1. Conseils de prévention

- 1 mettre à disposition du fourrage grossier de haute qualité ad libitum
- 2 fournir de l'eau de bonne qualité
- 3 permettre beaucoup de mouvement libre

Veillez à ce que votre cheval dispose d'une bonne alimentation de base et soit en bonne santé. Il doit disposer de suffisamment d'eau propre et d'une nourriture de bonne qualité.

Outre la simple disponibilité d'une quantité suffisante, il faut également veiller à ce que votre cheval puisse manger régulièrement de petites quantités. L'organisme est conçu pour cela, car les chevaux sont des animaux des steppes qui, à l'état sauvage, ont pratiquement toujours accès à la nourriture. Des pauses alimentaires prolongées suivies d'une ingestion avide d'une trop grande quantité de nourriture ne devraient pas être mis en place - et donc pas non plus chez l'homme.

Le point le plus important de la prévention des coliques est le mouvement libre. Il ne s'agit pas ici de monter le cheval ou de le longer, mais de se déplacer librement dans un enclos ou un pré.

6.2. À quoi faut-il faire particulièrement attention lorsqu'on garde un cheval au box ?

Dans la nature, les chevaux ne doivent pas chercher leur nourriture, ils l'adorent. De plus, les chevaux sont des animaux grégaires et fugitifs qui ne restent jamais longtemps au même endroit. La nourriture est non seulement disponible en permanence, mais l'organisme du cheval est également conçu pour se nourrir régulièrement.

La vie sous la responsabilité d'un humain peut parfois être tout le contraire. Ton cheval se trouve dans un box et la nourriture n'est également disponible que si tu la mets à disposition de ton cheval. Pour éviter des problèmes de santé tels que des coliques dans cette situation, vous devez tenir compte de certaines choses.

En ce qui concerne les constipations, les déplacements ainsi que les torsions, vous pouvez prévenir l'apparition de coliques par une bonne gestion de votre cheval. Les constipations, par exemple, peuvent survenir lorsque votre cheval, contrairement à sa nature, ingère de grandes quantités de nourriture en peu de temps.

Cet aspect est d'autant plus important au début et à la fin de la période de pâturage. Au début de la période de pâturage, le système digestif de votre cheval est encore adapté au foin et peut-être aux concentrés. Si de l'herbe fraîche arrive soudainement, la digestion s'arrête. Il en va de même pour votre cheval en automne, lorsque l'intestin attend de l'herbe et que du foin sec arrive à la place.

Durant ces phases, vous devez habituer progressivement votre cheval à la nouvelle situation : Une mise en pâture lente au printemps et l'ajout de foin au pâturage en automne rendront la transition plus agréable pour votre cheval. Les microbes intestinaux ont ainsi le temps de s'habituer au nouveau plan alimentaire.

Il est également très important d'avoir de l'eau fraîche - tous les jours bien sûr, mais surtout en hiver, tu devrais garder un œil sur le foin sec, car certains chevaux boivent moins qu'ils ne le devraient. En cas de gel, il faut veiller à ce que l'abreuvoir ne gèle pas.

Mettez de l'ordre dans et autour du box de votre cheval et ne laissez pas traîner de petites choses. Les jeunes chevaux sont généralement curieux et se laissent parfois distraire par de petites choses. La situation se complique lorsqu'ils mangent soudainement par inadvertance de petits objets qui traînent et qui bloquent alors l'intestin comme un morceau de nourriture.

7. CHECK-LIST POUR LA PRÉVENTION DES COLIQUES

- ✓ **Éviter le stress** : c'est bien sûr toujours une bonne idée, mais c'est justement le stress prolongé qui a un effet négatif sur le corps et donc sur le système digestif.
- ✓ **Bonne observation des animaux** : les connaissances aident à reconnaître et à classer les symptômes.
- ✓ **Équilibrer la ration** : les concentrés doivent être distribués en plusieurs petites portions tout au long de la journée, la quantité doit être adaptée aux besoins, c'est-à-dire au travail effectué.
- ✓ **Le fourrage grossier devrait toujours être disponible** : Cela favorise la santé de l'estomac et évite qu'un morceau de nourriture à peine structuré ne provoque une constipation dans l'intestin.
- ✓ **Un bon approvisionnement en eau** : La déshydratation augmente la probabilité de constipation.
- ✓ **Mouvement libre** : Cela favorise la motricité intestinale et maintient l'ensemble du cheval en forme.
- ✓ **Veiller à la santé des dents** : Si les chevaux ne peuvent plus mâcher correctement leur nourriture, cela peut favoriser la constipation.
- ✓ **Des vermifuges réguliers** pour prévenir les infestations parasites.

